

- ¿Cuál de las siguientes pruebas es la indicada para el diagnóstico de cáncer de próstata?
 - Antígeno prostático específico

- Lactante de 5 meses de edad con antecedente de prematuridad que presentó cuadro de membrana hialina y recibió ventilación mecánica invasiva durante un mes. Actualmente con signos de desnutrición, dificultad respiratoria dependiente de oxígeno. Fue hospitalizado en 02 oportunidades por cuadro similar a los 2 y 3 meses. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
 - Displasia broncopulmonar

- ¿Cuál es lo más importante para el diagnóstico de apendicitis aguda en niños?
 - Examen físico

- La planificación estratégica así como la prospectiva orientan las decisiones, no consisten en adivinar el futuro, sino sirven para:
 - Reducir la incertidumbre

- Adolescente de 15 años que acude por euforia, incremento de la actividad motora y alerta mental, disminución de la fatigabilidad. Examen físico midriasis, taquicardia e hipertensión arterial. ¿Cuál sería la droga causante de la sintomatología descrita?
 - Cocaína

- Varón de 45 años, sufre accidente de tránsito con traumatismo de extremidad inferior. Al examen: aumento de volumen de la extremidad inferior. Pulso pedio disminuido, parestesia del primer y segundo dedo del pie. ¿Cuál es el diagnóstico probable?
 - Síndrome compartimental

- En pacientes con antecedente de cólicos renales frecuentes asociados a litiasis renal. ¿Cuál es la bacteria que se asocia con mayor frecuencia?
 - *Proteus mirabilis*

- ¿Cuál de las siguientes alternativas **NO** es factor de riesgo para embarazo ectópico?
 - Edad adulta

- Varón de 36 años, quien refiere dolor epigástrico como de sensación de hambre doloroso, que ocurre 3-4 horas después de ingerir alimentos. Se le realiza endoscopia digestiva y se le diagnostica úlcera péptica. Hace 1 día presenta distensión abdominal y dolor intenso en epigastrio seguido de irritación peritoneal. ¿Cuál es el examen inmediato de elección para el paciente?
 - Radiografía simple de abdomen de pie

- ¿Cuál es el examen auxiliar más importante para el diagnóstico de diverticulitis colónica?
 - TAC de abdomen

- En la epilepsia mioclónica de la infancia ¿Cuál es la presentación más frecuente?
 - Epilepsia mioclónica progresiva

- ¿Cuál es el efecto secundario por el uso de Beta 2 agonistas?
 - Hipokalemia

- Según el test de Usher. ¿Cuál es el parámetro clínico que se encuentra en un recién nacido de 40 semanas?
 - Pliegues plantares en los 3/3.

- Paciente de 20 años, posterior a discusión con su pareja, ingiere 30 tabletas de clonazepam de 2 mg. ¿Cuál es el antídoto de elección?
 - Flumazenilo

- Paciente de 45 años, presenta abruptamente deposiciones líquidas blanquecinas frecuentes, tenesmo y dolor abdominal precedido de vómitos. Examen: signos de deshidratación moderada. Es diagnosticado como infección por cólera. ¿Cuál es el tratamiento inmediato?
 - Restaurar pérdida de líquidos

- Recién nacido de parto distócico en podálico, que presenta menor movilidad en el miembro superior izquierdo. Al examen: hombro en adducción, brazo rotado internamente y codo en extensión, con postura en "propina de mesero". ¿Cuál es la estructura nerviosa comprometida?
 - Plexo braquial

- ¿Qué tipo de relación causal puede establecerse entre el bacilo tuberculoso y la tuberculosis?
 - Necesaria, pero no suficiente

- Escolar de 14 años, hace 30 minutos presenta cefalea occipital, tinnitus, visión borrosa, vértigos y ataxia. Al examen físico se evidencia ptosis palpebral derecha ¿Qué tipo de migraña es?
 - Basilar

- Paciente con accidente cerebrovascular que presenta afasia de Broca. La lesión se produce en el lóbulo...:
 - Frontal izquierdo

- ¿Cuál es la disciplina que fundamenta a la Medicina Basada en la Evidencia?
 - Epidemiología clínica

- El Síndrome de lisis tumoral, **NO** se caracteriza por:
 - hipercloremia

- ¿Cuántas Kcal/día adicionales requiere la mujer durante el embarazo, para mantener la homeostasis metabólica?
 - 300

- Recién nacido de 40 semanas, con peso 3600g. A las 12 horas presenta tumoración en cabeza en la zona del parietal derecho, que no cubre suturas ni fontanelas, blando y renitente y en los días siguientes aumenta ligeramente de tamaño. No compromete estado general. ¿Cuál es el diagnóstico probable?
 - Céfalohematoma

- ¿Cuál es la operación de elección en una paciente con enfermedad de Graves-Basedow severa?
 - Tiroidectomía total

- ¿Cuáles son las bacterias más frecuentes que causan colangitis aguda en litiasis coledociana?
 - Klebsiella, E. coli, enterobacter

- En cuanto a las enfermedades oportunistas en los pacientes con SIDA. ¿Cuál es el tratamiento de elección en neumonía por *Pneumocystis carinii*?
 - Trimetoprim-sulfametoxazol

- Mujer de 40 años, que acude a consulta externa por nerviosismo, adelgazamiento, hiperfagia, intolerancia al calor; al examen físico: piel caliente, suave e hiperhidrosis. La hormona que está incrementada es de naturaleza:
 - Amina

- Mujer de 40 años cesareada en 3 oportunidades con tumoración parcialmente reductible a nivel de cicatriz operatoria mediana infraumbilical, hace 6 horas presenta dolor intenso tipo cólico y nota que la tumoración ha aumentado y no se reduce, concomitantemente náuseas y vómitos. Examen T: 37°C PA: 120/80mmHg FC: 90xmin. FR: 20xmin. Abdomen distendido, doloroso con tumoración infraumbilical de 15 X 10 cm no reductible a la palpación, RHA incrementados. ¿Cuál es el diagnóstico probable?
 - Eventración complicada

- ¿Qué célula produce la sustancia surfactante?
 - Neumocito tipo II

- La relación entre el ritmo circadiano y la presentación de crisis de asma bronquial ocasiona que ésta, predomine en el siguiente horario:
 - Entre 4 y 6 de la mañana

- Gestante de 19 años acude a consulta externa por fiebre continua de 39°C que comenzó ese mismo día. Refiere mialgia intensa en todo el cuerpo, dolor retroorbital. Hace 03 días estuvo en Tumbes visitando a un familiar. La fiebre cae luego de terapia antifebril, pero no llega a la normalidad. ¿Cuál es la indicación a seguir?
 - Internamiento con vigilancia continua

- Varón de 25 años, acude a Emergencia por dolor desde hace 12 horas en mesogastrio de tipo cólico e irradiado a la FID. Examen: T. axilar: 40°C, PA: 100/60 FC: 100x' y CV: RC normales. Abdomen: Mc Burney positivo, Blumberg positivo, RHA disminuidos. Laboratorio: leucocitosis: 12,000, abastados: 10%. Tacto rectal: doloroso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
 - Apendicitis aguda

- Gestante de 32 semanas, con antecedente de tres cesáreas previas. Ecografía: placenta previa total. ¿Cuál sería el mayor riesgo al que se enfrenta esta paciente?
 - Acretismo placentario

- ¿Cuál es la tumoración más frecuente que se presenta en el mediastino del adulto?
 - Timoma

- El mayor riesgo del RN prematuro durante el periodo perinatal es:
 - Poca vitalidad para soportar el proceso del parto

- La 17-OH-progesterona es secretada fundamentalmente por:
 - Células de la teca interna

- Varón de 67 años presenta falta de aire de inicio abrupto posterior a esfuerzo físico, refiere dolor leve retroesternal, con antecedente 03 episodios de dolor opresivo en el pecho de intensidad moderada en el último año, presenta sobrepeso. Al examen: orientado, lúcido. FC: 100 x m', PA: 96/60 mmHg., 2do ruido con aumento moderado de intensidad. Pulmones: murmullo vesicular audible en ambos campos pulmonares, no ruidos sobre agregados. Resto del examen normal. ¿El enfoque del padecimiento del paciente es de naturaleza?
 - Cardíaca

- ¿Cuál es la causa más frecuente de la colecistitis aguda?
 - Obstrucción del cístico

- RN de 39 semanas de edad gestacional. Nace por cesárea por estrechez pélvica materna. Apgar 8 al minuto. Examen clínico aparentemente normal, salvo moderada dificultad respiratoria. Test Silverman Anderson 5. ¿Cuál es el diagnóstico probable?
 - Taquipnea transitoria del RN

- Mujer de 36 años, acude por presentar hipermenorreas y anemia. Tiene ecografía compatible con leiomioma uterino submucoso. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado?
 - Histeroscopia quirúrgica

- Mujer de 23 años con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, asociado a resistencia a la insulina. ¿Cuál de los siguientes resultados de laboratorio es más frecuente encontrar en éste síndrome?
 - Incremento de testosterona libre

- ¿Cuál es la composición química más frecuentes de los cálculos renales?
 - Oxalato de calcio

- Gestante de 35 semanas. Hace tres días refiere prurito intenso a predominio palmar y plantar, sobre todo en las noches. No presenta lesiones dérmicas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
 - Colestasis gestacional

- El signo de Murphy es característico de:
 - Colecistitis aguda

- Gestante de 30 semanas, presenta cefalea intensa y epigastralgia. PA: 140/90 mm Hg recurrente. Laboratorio: albuminuria cualitativa (++) . ¿Cuál es el diagnóstico?
 - Pre-eclampsia severa

- Mujer de 32 años, G3 P2012, acude a consulta refiriendo dolor a nivel de hipogastrio de 3 semanas de evolución; al examen se encuentra cérvix doloroso a la lateralización, y anexos dolorosos, no evidenciándose flujo vaginal. De acuerdo al cuadro clínico, el tratamiento indicado es:
 - Ceftriaxona + Doxiciclina

- Un médico interviene un brote de enfermedad transmitida por alimentos (ETA) en trabajadores de una fábrica; identificando como factor común el almuerzo consumido el día anterior en el comedor institucional. Para lo cual estudió a 20 trabajadores afectados asignando un testigo para cada uno; encontrando que de 5 posibles causas, el alimento asociado fue la mayonesa con un OR de 3.5 y un IC: 1.9 a 7.2. ¿Qué tipo de estudio realizó para encontrar el alimento asociado a la ETA?
 - Casos y controles

- La obesidad mórbida aumenta significativamente el riesgo de:
 - Hipertensión arterial

- ¿Qué porción de la vía biliar principal compromete el tumor de Klatskin?
 - Bifurcación hepática

- ¿Cuál es la medida conservadora que ayuda al tratamiento de la tromboflebitis superficial?
 - Elevación de las extremidades

- Varón de 60 años consulta por presentar desde hace 2 meses edema de miembros inferiores. Como antecedente fue diagnosticado de HTA y obesidad hace 3 meses y le indican atorvastatina, ácido acetil salicílico, amlodipino, metformina e hidroclotiazida. ¿Cuál de los fármacos que recibe es el causante del edema que presenta el paciente?
 - Amlodipino

- Recién nacido de 37 semanas de edad gestacional, con peso en el percentil 15. ¿Cuál sería su clasificación neonatal para su edad gestacional?
 - A término adecuado

- ¿Por debajo de qué edad, en años, se considera menopausia precoz?
 - 40

- Varón de 55 años que presenta dolor agudo en región lumbar por diagnóstico de espondilitis anquilosante. Facultativo decide usar un antiinflamatorio selectivo para la COX-2. ¿Cuál de los siguientes fármacos indicaría?
 - Celecoxib

- En un diabético, la combinación de hiperglicemia (> 300 mg/dL) y ausencia tanto de lipólisis como de cetonuria describen un estado:
 - Hiperosmolar

- RN de 72 hs. que presenta ictericia hasta el cuello. Con nivel de bilirrubina de 8 mg/dL., en buen estado general, reflejos normales e hígado palpable a 2 cm. del reborde costal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
 - Ictericia fisiológica

- ¿Cuál es el tipo de incontinencia urinaria que se presenta por contracciones involuntarias del músculo detrusor?
 - Urgencia

- ¿Cuál de las siguientes enzimas pancreáticas digiere hidratos de carbono?
 - Amilasa

- ¿Cuáles son los componentes de la llamada triada mortal en shock hemorrágico severo?
 - Hipotermia, coagulopatía y acidosis metabólica

- ¿Cuál es el tratamiento de elección en una colédocolitiasis?
 - Papiloesfinterotomía endoscópica

- ¿Cuál de las siguientes alternativas es la medida prioritaria en la atención inmediata del recién nacido?
 - Aspiración de secreciones y secado de piel

- ¿Cuál es la incisión de elección en un paciente que presenta una herida de bala en el abdomen?
 - Mediana

- Se recibe a un RN de 3400 g. con llanto enérgico, buen tono muscular y discreta cianosis distal. El procedimiento a seguir es:
 - Secarlo y colocarlo en contacto materno piel a piel.

- Lactante de 11 meses, presenta dolor agudo en la región periumbilical y abdomen inferior, aletargado, posición de defensa con rodillas flexionadas, heces en jalea de grosella. ¿Cuál es el diagnóstico probable?
 - Invaginación

- Varón 62 años con antecedente de tabaquismo y baja de peso, presenta en la Rx tórax nódulo pulmonar de 2.5 cm de bordes irregulares en el ápice pulmonar derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
 - Carcinoma broncogénico

- Gestante de 38 semanas, acude a emergencia por presentar desde hace 3 horas dolor abdominal intenso y sangrado vaginal rojo rutilante. Antecedente de preeclampsia en el parto anterior. Al examen: hipertensión uterina y LCF: 128 x min, al tacto vaginal no cambios cervicales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
 - Desprendimiento prematuro de placenta

- ¿Cuál de los siguientes estudios epidemiológicos corresponde al estudio que no tiene direccionalidad y parte de una población de estudio extraída de una población de referencia dentro de la cual buscará enfermos y sanos, expuestos y no expuestos, pero en un momento del tiempo?
 - De prevalencia

- Las células que producen ácido clorhídrico y factor intrínseco son las:
 - Parietales

- La dispepsia es inducida mayormente por ingesta de...
 - café

- ¿En qué órgano lesionado se aplica la maniobra de Pringle?
 - Hígado

- La dermatitis atópica es una afección cutánea crónica caracterizada por disfunción de la epidermis y los Linfocitos T. ¿Con cuál de las siguientes enfermedades se relaciona?
 - Eccema atópico

- ¿Qué dedos son los más comprometidos en la Enfermedad de Dupuytren?
 - Anular y meñique

- ¿Cuál de los siguientes factores o condiciones que intervienen en las infecciones intrahospitalarias, está más asociado con una infección de sitio quirúrgico por estafilococo?
 - Inadecuado lavado de manos

- Mujer de 40 años, consulta por presentar edema de miembros inferiores y orinas espumosas desde hace 4 meses. Antecedente: LES hace 5 años. Examen: palidez de piel, fascias abotagada, edema en miembros inferiores y Signo de Godet (++) . Examen de orina: proteínas (+++), leucocitos: 6-8 por campo, Hematíes: 1 por campo. ¿Cuál de los siguientes exámenes solicitaría para confirmar el diagnóstico de la alteración Renal?
 - Proteinuria en orina de 24 horas

- ¿Cuál es un criterio de convulsión febril simple?
 - Convulsión con duración máxima de 15 minutos.

- ¿Cuál de las siguientes patologías es causa de oligohidramnios?
 - Agenesia renal

- En la reanimación cardiopulmonar (RCP) básica está indicado usar...
 - masaje cardiaco antes de la ventilación.

- La siguiente definición: “*Es la provisión continua y con calidad de una atención orientada hacia la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud, para las personas, en el contexto de su familia y comunidad*”. Corresponde a:
 - **Atención Integral de Salud**

- Mujer de 34 años que luego de ingesta alimenticia presenta deposiciones diarreicas persistentes. Al examen: Lúcida, deshidratada y leve dolor a la palpación profunda en todo el abdomen. ¿Cuál es el trastorno del equilibrio ácido-base más probable?
 - **Acidosis metabólica**

- En el tratamiento agudo de taquicardia paroxística supraventricular (TPSV) sin compromiso hemodinámico. ¿Cuál es el fármaco de elección?
 - **Adenosina**

- ¿Cuál de los siguientes patrones bioquímicos se encuentra en la osteoporosis?
 - **Calcemia normal, fosforemia normal y fosfatasa alcalina normal.**

- Mujer de 36 años, acude por sangrado abundante durante la menstruación. Refiere tener ecografía con diagnóstico de miomatosis uterina múltiple. ¿Cuál sería la localización, según la patología de la paciente?
 - **Submucoso**

- En relación a VIH y gestación. ¿A partir de qué semana se recomienda la administración de antirretrovirales?
 - **14**

- RN de 4200 g, por parto vaginal con dificultad en la expulsión. Apgar 8 al min. Presenta impotencia funcional del miembro superior derecho, tumoración dolorosa a la palpación encima del hombro. Reflejo moro unilateral. Resto del examen sin alteración. ¿Cuál es el diagnóstico probable?
 - **Fractura de clavícula**

- Varón de 65 años, 06 horas después de prostatectomía presenta hematuria franca con hipotensión de 66/40 mmHg por aproximadamente 4 horas. Dos horas después presenta diuresis de 15 ml/hora. La urea y creatinina en sangre se duplican. ¿Cuál es el manejo inmediato?
 - **Mantener volumen arterial efectivo**

- Mujer de 34 años G6 P4024, último parto hace 4 años que refiere menstruaciones irregulares, insomnio y alteración de carácter. Acude a consulta porque desea método anticonceptivo. Luego de la consejería adecuada. ¿Cuál de los siguientes métodos recomendaría a la paciente?
 - **Anticonceptivos orales combinados**

- Los inhibidores directos de la renina son una clase novedosa de antihipertensivos que inhiben al sistema renina angiotensina (SRA) en su origen, un ejemplo de estos fármacos es:
 - **Aliskiren**

- Varón de 65 años presenta dolor y distensión abdominal aguda, no elimina flatos desde hace 18 horas.
 - Antecedentes: estreñimiento crónico y en tratamiento con psicotrópicos. Examen físico: BEG, BEH, afebril, no
- taquicardia. Abdomen muy distendido y timpánico, contractura abdominal, signo de rebote negativo.
- Leucocitos normales. Radiología: signo de "grano de café". Laparotomía exploratoria: vólvulo de sigmoides no complicado. ¿Cuál es la operación indicada?
 - Resección del Sigmoides+anastomosis

- El financiamiento del Seguro Integral de Salud está dirigido a:
 - La demanda

- ¿Cuál es el germen más frecuente de la conjuntivitis bacteriana en los niños?
 - *Staphylococcus aureus*

- En el desarrollo psicomotor del lactante ¿A qué edad en meses, construye torres de dos cubos?
 - 15

- Gestante de 30 semanas por FUR, presenta rotura de membranas desde hace tres días. Funciones vitales normales. LCF: 145 x min. No tiene dinámica uterina. ¿Cuál es la indicación más apropiada para evitar complicaciones?
 - Antibioticoterapia

- ¿Cómo se llama la hernia que protruye a través de la línea semilunar (borde externo de los rectos)?
 - Spiegel

- Se define como RN de "extremadamente peso bajo al nacer" a los que tienen un peso inferior a.....g.
 - 1000

- En el Perú, ¿Cuál es la categoría de los establecimientos de salud que brindan atención especializada en un campo clínico o grupo étnico, y están en la capacidad de prestar servicios de atención ambulatoria, de hospitalización y de emergencia en la especialidad que desarrollen, según corresponda?
 - II

- Mujer de 65 años con sensación de bulto en vagina. Al examen: pared anterior de vagina que protruye por fuera del introito, según la clasificación de prolapso de órganos pélvicos (POP-Q) tiene el punto Ba en +3 y una longitud de vagina de 6. ¿Cuál es el estadio de la distopia genital del punto Ba?
 - III

- Mujer de 45 años, con IMC de 35, el cual es un factor de riesgo para leiomiomatosis uterina, cáncer de endometrio y cáncer de mama, por la presencia de una enzima denominada...
 - **aromatasa.**

- ¿Cuál es el virus que produce más frecuentemente bronquiolitis?
 - **Virus sincitial respiratorio**

- El médico de un centro de salud decide realizar una visita domiciliaria a todos los niños con más de cinco episodios de diarrea aguda en el último año. En una de las visitas reúne a los padres y 3 hermanos mayores; les habla sobre los factores de riesgo encontrados en la visita y sobre las acciones que deben desarrollar para reducirlos o eliminarlos. ¿Cuál es la acción de información, educación y comunicación (IEC) que ha realizado?
 - **Charla**

- Con respecto a la fase 2 de la fecundación: ¿Qué sucede cuando el espermatozoide entra en contacto con el óvulo?
 - **Cambia la permeabilidad de la zona pelúcida**