

1. ¿Cuál de las siguientes alternativas es función del lactógeno placentario humano?  
A. Promover el paso de la glucosa al feto  
B. Mantener el cuerpo lúteo  
C. Disminuir la motilidad del músculo liso  
D. Ejercer acción inmunosupresora  
E. Estimular la diferenciación sexual masculina
2. En una paciente con historia previa de preeclampsia con signos de severidad. ¿Cuál de los siguientes fármacos es utilizado para prevenir y/o disminuir la severidad de la preeclampsia en el embarazo actual?  
A. Aspirina 80 mg  
B. Nifedipino 10 mg  
C. Metildopa 1 g  
D. Hidralazina 50 mg  
E. Sulfato de magnesio 2 g
3. ¿Cómo se denomina al signo que sugiere rotura esplénica?  
A. Kehr  
B. Obturador  
C. Grey Turner  
D. Cullen  
E. Psoas
4. En el niño deshidratado. ¿Cuál es el trastorno electrolítico que produce más frecuentemente daño neurológico grave?  
A. Hipernatremia  
B. Hiponatremia  
C. Hiperpotasemia  
D. Hipopotasemia  
E. Hipocalcemia
5. Mujer de 30 años acude por hipermenorrea de un año de evolución, además de cansancio fácil, refiere que es usuaria de anticonceptivos orales combinados. ¿Cuál es el diagnóstico?  
A. Miomatosis uterina  
B. Síndrome de ovario poliquístico  
C. Hipertiroidismo  
D. Endometriosis pélvica  
E. Hiperplasia endometrial
6. Varón de 48 años, consulta por presentar progresivamente pérdida de audición en el oído derecho, acompañado de vértigos, acúfenos pulsátiles, dolor tenebrante profundo, parálisis facial y supuración. ¿Cuál es el diagnóstico probable?  
A. Tumor de oído medio o interno  
B. Síndrome vestibular  
C. Otitis media supurada  
D. Laberintitis  
E. Otitis externa supurada
7. En una deflexión de III Grado. ¿Cuáles son las estructuras anatómicas palpables al tacto vaginal?  
A. Arcos supraorbitarios y mentón  
B. Sutura frontal y lambdoidea  
C. Dorso de la nariz y sutura bregmática  
D. Fontanela anterior y borde orbitario  
E. Dorso de la nariz y fontanela lambdoidea
8. En la Rx de tórax de un neonato prematuro con dificultad respiratoria se describe: parénquima con granulación reticular fina y broncogramas aéreos. ¿En qué patología se sospecha?  
A. Enfermedad de membrana hialina  
B. Síndrome de aspiración meconial  
C. Hernia de Bochdalek  
D. Secuestro pulmonar  
E. Taquipnea transitoria del RN
9. ¿Qué porcentaje del área bajo la curva normal estándar se localiza entre  $\pm 2$  desviaciones estándares de la media?  
A. 95.4  
B. 58  
C. 68.3  
D. 90.4  
E. 99
10. Según la clasificación de la encefalopatía hipóxica isquémica de Samat, un recién nacido letárgico, con succión débil, pupilas mióticas y EEG con espigas onda. ¿A qué grado corresponde?  
A. 2  
B. 1  
C. 3  
D. 5  
E. 4

11. Durante el trabajo de parto, la presentación más común es la variedad occipito iliaca...  
A. izquierda anterior. D. derecha anterior.  
B. derecha posterior. E. transversa derecha.  
C. izquierda posterior.
12. ¿Cuál es el agente causal que en las quemaduras determina mayor necrosis coagulativa y profunda?  
A. Grasa hirviendo D. Fuego directo  
B. Agua caliente E. Aire caliente  
C. Vapor de agua caliente
13. ¿Cuál es el tratamiento de una fractura distal del radio que no compromete la articulación y que no está desplazada?  
A. Inmovilización con yeso D. Reducción abierta  
B. Clavos percutáneos E. Reducción cerrada  
C. Clavos percutáneos + fijación externa
14. Mujer de 60 años con estreñimiento crónico, dolor y sangrado rojo rutilante a la defecación, acompañado de protrusión de un "bulto" por el ano que la reduce con la mano. ¿Cuál es el tipo de hemorroides que presenta?  
A. Interna de tercer grado D. Externa trombosada  
B. Interna de cuarto grado E. Interna de segundo grado  
C. Interna de primer grado
15. Mujer de 60 años politraumatizada, con diagnóstico de fractura de pelvis estable. Examen: PA: 90/60 mmHg, abdomen ligeramente doloroso sin reacción peritoneal. Ecografía FAST negativa. ¿Cuál es el manejo inicial?  
A. Reposición de volumen D. Laparotomía exploradora  
B. Tomografía abdominal E. Lavado peritoneal diagnóstico  
C. Laparoscopia diagnóstica
16. ¿Cuál es el método ideal para el diagnóstico de insuficiencia venosa periférica?  
A. Doppler manual D. Prueba de Perthes  
B. Pletismografía E. Prueba de Brodie-Trendelenburg  
C. Flebografía
17. En una paciente en tratamiento por endometritis puerperal. ¿Cuántas horas debe permanecer afebril para suspender dicho tratamiento?  
A. 24 a 48 D. 4 a 6  
B. 8 a 12 E. 12 a 20  
C. 72 a 96
18. En el Centro de Salud Ama Kella se está elaborando el Plan de Salud Local requiriéndose la asistencia técnica (apoyo técnico, recursos y ejecución de proyectos). Según el MAIS Basado en Familia y Comunidad. ¿En cuál de los paquetes está comprendida la asistencia técnica?  
A. Promoción de comunidades saludables D. Desarrollo institucional  
B. Producción de servicios E. Apoyo técnico de los servicios  
C. Metas de desarrollo sanitario local
19. Paciente de 23 años, G2 P1102, acude al consultorio manifestando presentar secreción vaginal abundante verdosa e irritación vulvar desde hace 7 días. Examen: cérvix uterino en fresa. El diagnóstico es.....y el mejor manejo terapéutico es con.....  
A. tricomoniasis/ metronidazol. D. vulvovaginitis / clindamicina.  
B. vaginosis bacteriana / metronidazol. E. vaginitis atrófica / estrógenos.  
C. candidiasis / fluconazol.
20. Para el diagnóstico de anemia ferropénica. ¿Cuál es el marcador de laboratorio más sensible?  
A. Ferritina sérica D. Hemosiderina  
B. Transferrina E. Saturación de hierro  
C. Hierro sérico

21. Mujer de 45 años, obesa, dos horas después de haber sido operada de histerectomía total, súbitamente presenta dolor intenso en el pecho, disnea, lipotimia y sensación de muerte inminente. Examen: no ingurgitación yugular, reforzamiento del segundo ruido en foco pulmonar, cianosis y taquicardia. Pulmones: normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A. Tromboembolismo pulmonar  
B. Coartación de aorta  
C. Infarto de miocardio  
D. Aneurisma de aorta  
E. Neumonía aspirativa
22. El médico jefe de un establecimiento de salud realiza un taller con su equipo de gestión. En base al ASIS identifican y priorizan problemas. Programan tareas y recursos que garanticen la ejecución de actividades para el logro de objetivos y metas del siguiente año fiscal. ¿Qué tipo de planificación han desarrollado?
- A. Operativa  
B. De recursos  
C. Estratégica  
D. Táctica  
E. Contingencial
23. ¿Cuál de los siguientes fármacos anticonvulsivantes es químicamente similar a los antidepresivos tricíclicos?
- A. Carbamazepina  
B. Ácido valproico  
C. Fenitoína  
D. Gabapentina  
E. Tiagabina
24. En una paciente con infección por VIH. ¿En qué caso podría darse parto vaginal?
- A. Dilatación más de 4 cm  
B. Ruptura de membranas mayor de 4 horas  
C. Paciente que inicia TARGA  
D. Paciente con control prenatal irregular  
E. Multigesta diagnosticada de VIH en trabajo de parto
25. Preescolar de 3 años presenta hace tres días fiebre de 39°C, hace un día ojos inflamados con secreción amarillenta y eritema faríngeo. ¿Cuál es el agente causal probable?
- A. Adenovirus  
B. *Streptococcus pneumoniae*  
C. Virus sincitial respiratorio  
D. *Haemophilus influenzae*  
E. *Chlamydia trachomatis*
26. ¿Cuál es causa más frecuente de obstrucción intestinal en pacientes no operados en países no industrializados?
- A. Hernias  
B. Vólvulo  
C. Neoplasias  
D. Íleo biliar  
E. Malformación intestinal
27. Recién nacido a término, peso 3500 g, APGAR 9 al minuto, en alojamiento conjunto, recibe lactancia materna, funciones biológicas normales. Madre hace 15 horas ha presentado hemoptisis con resultados BK++. ¿Cuál es la conducta en el recién nacido?
- A. Quimioprofilaxis  
B. PPD  
C. Radiografía de tórax  
D. BCG  
E. Solicitar BK
28. ¿Cuál de las siguientes patologías está relacionada a la infección por virus del Zika durante la gestación?
- A. Microcefalia  
B. Agenesia renal  
C. Hidrocefalia  
D. Gastrosquisis  
E. Agenesia pulmonar
29. Gestante de 33 años, G4 P2012, de 34 semanas por FUR acude a su primer control. Tiene grupo y factor O negativo y Coombs indirecto positivo, nunca se ha colocado la inmunoglobulina anti D. Para determinar la anemia fetal por ecografía el parámetro a evaluar, es la velocidad de...
- A. la arteria cerebral media.  
B. la arteria umbilical.  
C. las arterias uterinas.  
D. el ductus venoso.  
E. las arterias mesentéricas.
30. En el tratamiento de una intoxicación por cocaína. ¿Cuál de los siguientes fármacos está contraindicado?
- A. Propranolol  
B. Nitroglicerina  
C. Midazolam  
D. Verapamilo  
E. Diazepam

31. Varón de 70 años, presenta: halitosis, ronquera, disfagia a sólidos y líquidos, regurgitaciones de alimentos sin digerir y mal olientes. Antecedente de faringitis crónica, niega otra enfermedad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A. Divertículo de Zenker  
B. Acalasia  
C. Candidiasis esofágica  
D. Cáncer de estómago  
E. Esclerodermia
32. ¿A qué tipo de fractura se denomina "en rama verde"?
- A. Diafisaria de cúbito  
B. Diafisaria de húmero  
C. Epifisaria de cúbito  
D. Epifisaria de húmero  
E. Diafisaria de radio
33. Durante el control prenatal, una gestante diagnosticada de VIH por primera vez. ¿En qué semana de edad gestacional se inicia la terapia antirretroviral triple?
- A. 14  
B. 10  
C. 7  
D. 20  
E. 22
34. En el resultado de los ensayos clínicos aleatorizados de fármacos para tratamiento nuevo. ¿A qué conclusión lleva un error tipo I?
- A. Positiva falsa de que el tratamiento es efectivo  
B. Negativa falsa de que el tratamiento no es efectivo  
C. No hay influencia en la efectividad del tratamiento  
D. La selección de la variable no fue adecuada  
E. Se deben utilizar pruebas bilaterales
35. Varón de 30 años, politraumatizado por accidente de tránsito, es evaluado en emergencia. Examen: ansioso, confuso, pálido, pulso: >120 X', hipotenso, FR: 30-40 X' y diuresis: 5-15 ml/h. Abdomen distendido y doloroso; se sospecha hemoperitoneo. ¿Qué clase de shock hemorrágico presenta?
- A. IV  
B. I  
C. II  
D. III  
E. V
36. Varón de 25 años con fiebre reciente de cinco días de evolución y antecedente epidemiológico de exposición a dengue, refiere artralgiás, mialgiás, cefalea, dolor retro-ocular, dolor lumbar y se evidencia erupción cutánea. ¿A qué tipo de caso de la clasificación de dengue corresponde?
- A. Probable sin signos de alarma  
B. Sospechoso con signos de alarma  
C. Confirmado por laboratorio  
D. Descartado  
E. Grave
37. Para disminuir el riesgo de trombosis venosa profunda recurrente, se decide utilizar heparina no fraccionada. ¿Cuál es el examen de laboratorio para monitoreo?
- A. Tiempo de tromboplastina parcial activado  
B. Cociente internacional normalizado (INR)  
C. Tiempo de protrombina  
D. Recuento de plaquetas  
E. Dosaje de Vitamina K
38. Mujer de 25 años diabética mal controlada, acude a emergencia deshidratada y somnolienta. Examen: FC: 90 X', FR: 28 X', PA: 110/70 mmHg. Laboratorio: glicemia: 280 mg/dL, glucosuria y cetonuria. ¿En qué segmento de la nefrona se ha superado el mecanismo de transporte máximo de glucosa?
- A. Túbulo proximal  
B. Asa de Henle  
C. Túbulo distal  
D. Túbulo colector  
E. Glomérulo
39. La neumonía eosinofílica caracterizada por infiltrados alveolares migratorios y mínimas manifestaciones clínicas corresponde a:
- A. Síndrome de Loeffler  
B. Granulomatosis alérgica de Churg-Strauss  
C. Micosis pulmonar alérgica  
D. Neumonía eosinofílica aguda  
E. Síndrome de Goodpasture

40. La parálisis de Bell se produce por lesión del nervio...  
A. **facial.** D. lacrimal.  
B. trigémino. E. vago.  
C. infraorbitario.
41. Según la clasificación histológica de la nefritis lúpica. ¿En qué clase se ubica la nefritis membranosa?  
A. **V** D. VI  
B. III E. II  
C. IV
42. ¿Cuál es el examen por imágenes que mejor confirma la presencia de bronquiectasia?  
A. **Tomografía axial computarizada** D. Resonancia magnética  
B. Radiografía de tórax E. Ecografía torácica  
C. Gammagrafía pulmonar
43. Varón de 40 años con historia personal donde prima la búsqueda de su propia satisfacción a costa del sufrimiento de los demás, sin capacidad de cambio ni culpa a pesar de las consecuencias. ¿Qué trastorno de personalidad presenta?  
A. **Antisocial** D. Paranoide  
B. Límitrofe E. Esquizoide  
C. Obsesivo
44. Varón de 20 años con diagnóstico de asma bronquial desde hace cinco años y en tratamiento con salmeterol de larga data. ¿Cuál de los siguientes efectos adversos está relacionado a su administración?  
A. **Hiperglicemia** D. Bradicardia  
B. Hiperkalemia E. Disminución de ácidos grasos libres  
C. Hipocalcemia
45. Mujer de 30 años, VIH positivo, hace 15 días presenta fiebre y cefalea. Examen: signos meníngeos presentes. Cultivo de líquido cefalorraquídeo positivo a *Cryptococcus neoformans*. ¿Cuál es el tratamiento de inducción para la meningitis?  
A. **Anfotericin B + Flucitosina** D. Fluconazol + Corticoides  
B. Trimetoprim + Sulfametoxazol E. Sulfadiazina + Pirimetamina  
C. Ganciclovir + Corticoides
46. Recién nacido a término, con diagnóstico de incompatibilidad Rh, a las primeras 12 horas de vida presenta ictericia hasta plantas. Madre es A negativa y el niño es O positivo. El paciente tiene indicación de exanguinotransfusión. ¿Qué grupo sanguíneo y factor debe indicar para el procedimiento?  
A. **O negativo** D. B positivo  
B. O positivo E. AB negativo  
C. A positivo
47. La fase proliferativa de la cicatrización de las heridas está entre los 4–12 días. ¿Cuál es la característica de esta etapa?  
A. **Formación de tejido de granulación** D. Invasión de los linfocitos a la herida  
B. Detención de la síntesis del colágeno E. Disminuye la proliferación de células endoteliales  
C. Gran actividad de macrófagos
48. De todas las neoplasias ováricas benignas en mujeres jóvenes. ¿Cuál es la tumoración quística más común?  
A. **Teratoma maduro** D. Teratoma inmaduro  
B. Cistoadenoma E. Estruma ovárico  
C. Tumor de Brenner
49. ¿Cuál es la manifestación clínica más frecuente de la insuficiencia cardíaca del recién nacido?  
A. **Disnea** D. Hepatomegalia  
B. Ingurgitación yugular E. Ritmo de galope  
C. Edema periférico

50. En el apnea primaria del recién nacido. ¿Qué acción debe realizarse?  
A. Estimulación táctil  
B. Ventilación a presión positiva  
C. Masaje cardíaco  
D. Intubación endotraqueal  
E. Adrenalina EV
51. En pacientes con insuficiencia renal crónica. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es indicación de diálisis de emergencia?  
A. Hiperkalemia severa  
B. Derrame pleural  
C. Alcalosis metabólica  
D. Hiponatremia severa  
E. Hipoxemia severa
52. ¿Cuál es el tipo de soplo que caracteriza a la insuficiencia mitral?  
A. Holosistólico de tono alto en ápex, irradiado a axila  
B. Sistólico eyectivo de timbre rudo, irradiado al cuello  
C. Mesodiastólico regurgitativo con chasquido de apertura  
D. Diastólico aspirativo irradiado a borde paraesternal izquierdo  
E. Holosistólico suave, paraesternal izquierdo y subxifoideo
53. ¿Cuál de las siguientes alternativas, es la manifestación clínica característica de la eclampsia?  
A. Convulsiones tonicoclónicas generalizadas  
B. Convulsiones complejas  
C. Crisis psicógenas  
D. Convulsiones parciales  
E. Convulsiones tonicoclónicas posturales
54. En un establecimiento I-4, la evaluación de indicadores del último quinquenio muestra cambio de las primeras causas de morbilidad y de las prioridades sanitarias de la demanda, sin incremento de la población total. ¿Qué decisión estratégica debe tomar e implementar el equipo de gestión?  
A. Replantear la misión del establecimiento  
B. Solicitar cambio del establecimiento a nivel II  
C. Implementar servicio de hospitalización  
D. Realizar mercadeo social para incremento de partos  
E. Mejorar las técnicas de diagnóstico de laboratorio
55. Mujer de 70 años con diagnóstico de colecistitis aguda. Antecedente: insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuál es la escala ASA que le corresponde desde el punto de vista anestesiológico?  
A. IV  
B. II  
C. III  
D. V  
E. VI
56. Mujer de 65 años, consulta por dolor en columna dorso lumbar de dos años de evolución. Se plantea el diagnóstico de osteoporosis. ¿Qué examen solicita para confirmar el diagnóstico?  
A. Densitometría ósea  
B. Resonancia magnética con secuencia espectroscópica  
C. Resonancia magnética con secuencia de difusión  
D. Resonancia magnética funcional  
E. Tomografía axial computarizada ósea
57. ¿Cuál es la causa más frecuente de recidiva de una hernia incisional mayor de 3 cm?  
A. Reparación primaria con sutura  
B. Edad avanzada  
C. Malnutrición  
D. Ascitis  
E. Embarazo
58. En el tratamiento de la crisis asmática. ¿Qué grupo farmacológico se indica inicialmente?  
A. Beta 2 agonistas de acción corta  
B. Beta 2 agonistas de acción larga  
C. Metilxantinas  
D. Corticosteroides  
E. Anticolinérgicos
59. Para el diagnóstico de endocarditis infecciosa. ¿Cuál de los siguientes enunciados de Duke es un criterio mayor?  
A. Hemocultivos positivos para microorganismos típicos  
B. Fiebre igual o superior a 38°C  
C. Evidencia serológica de infección activa  
D. Fenómenos vasculares embólicos periféricos  
E. Factor reumatoideo positivo

60. Según la Organización Mundial de la Salud, se define obesidad clase II cuando el IMC está entre.....Kg/m<sup>2</sup>  
A. 35 – 39.9  
B. 20 – 24.9  
C. 30 – 34.9  
D. 25 – 29.9  
E. 40 – 44.9
61. ¿Cuál es el factor predictor más importante de nefropatía diabética incipiente?  
A. Microalbuminuria  
B. Aminoaciduria  
C. Glucosuria  
D. Mioglobinuria  
E. Cilindruria
62. Gestante de 38 semanas por FUR, G6 P5005, acude a emergencia por cefalea, trastornos visuales y oliguria. Examen: no trabajo de parto, FCF: 136 X', PA: 152/112 mmHg en dos controles de 6 horas de intervalo. Trombocitopenia, proteinuria 2+ y creatinina sérica elevada. ¿Cuál es el diagnóstico?  
A. Preeclampsia con signos de severidad  
B. Hipertensión gestacional  
C. Hipertensión crónica  
D. Eclampsia  
E. Preeclampsia sobreimpuesta
63. En la diarrea infantil. ¿Cuál es el disturbio ácido básico más frecuente?  
A. Acidosis metabólica  
B. Alcalosis metabólica  
C. Acidosis respiratoria  
D. Alcalosis respiratoria  
E. Acidosis tubular
64. Varón de 18 años presenta tos seca, sensación de opresión en el tórax y disnea intermitente que empeora en el invierno desde hace 2 años. Examen: sibilantes en ambos campos pulmonares. Se sospecha de asma bronquial. ¿Qué parámetro de la función pulmonar se encuentra más disminuido en el paciente?  
A. Volumen espiratorio forzado al primer segundo  
B. Volumen de reserva inspiratoria  
C. Volumen de ventilación pulmonar  
D. Capacidad inspiratoria  
E. Capacidad vital
65. ¿Cuál es el estudio de imagen de elección en un anciano con sospecha de apendicitis aguda plastronada?  
A. Tomografía axial computarizada  
B. Resonancia magnética nuclear  
C. Ecografía abdominal  
D. Gammagrafía  
E. RX simple de abdomen de pie
66. ¿Cuál es la lesión más frecuente en los preescolares en la línea media del cuello?  
A. Quiste del conducto tirogloso  
B. Fístulas congénitas  
C. Adenopatía  
D. Vestigios del primer surco faríngeo  
E. Higromas quísticos
67. Niño en edad pre-escolar sin antecedentes de importancia, presenta tumoraciones cervicales bilaterales a lo largo del borde del músculo esternocleidomastoideo. Examen: pequeñas adenopatías palpables, móviles no dolorosas y de consistencia blanda. ¿Cuál es la etiología probable?  
A. Adenovirus  
B. Virus de la gripe  
C. Streptococcus grupo A  
D. Parvovirus  
E. Staphylococcus aureus
68. En una adolescente con dismenorrea primaria. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?  
A. Antiinflamatorios no esteroideos  
B. Anticonceptivos orales  
C. Anticolinérgicos  
D. Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina  
E. Antagonista de las gonadotropinas
69. En un estudio de colposcopia. ¿Cuál es un hallazgo anormal?  
A. Epitelio captador de yodo  
B. Epitelio escamoso original  
C. Epitelio cilíndrico  
D. Zona de transformación tipo I  
E. Zona de transformación tipo II

70. Mujer de 38 años acude por presentar leucorrea y sangrado post coital hace 6 meses. FUR: hace 8 días. Primera relación sexual: 16 años. N° de parejas sexuales: 4. Método anticonceptivo: ritmo. PAP: LIE de alto grado. Biopsia por colposcopia: Ca in Situ. ¿Cuál es la conducta a seguir?
- A. Conización fría del cérvix  
B. Histerectomía total  
C. Histerectomía radical  
D. Conización con asa LEEP  
E. Histerectomía ampliada a vagina
71. En un recién nacido se encuentra una colección de sangre por debajo de la aponeurosis que cubre el cuero cabelludo a lo largo de todo el músculo occipitofrontal. ¿Cuál es el diagnóstico?
- A. Hemorragia subgaleal  
B. Cefalohematoma  
C. Caput succedaneum  
D. Hematoma temporal  
E. Hematoma frontal
72. ¿A partir de qué estructura se desarrollan las células yuxtaglomerulares?
- A. Arteriola aferente  
B. Mesangio  
C. Túbulo proximal  
D. Capilar peritubular  
E. Asa de Henle
73. En paciente con diagnóstico de shock séptico. ¿Cuál es la primera medida terapéutica a indicar?
- A. Administración de cloruro de sodio al 9%  
B. Infusión de dopamina  
C. Transfusión de sangre total  
D. Administración de bicarbonato de sodio  
E. Infusión de adrenalina
74. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la varicela?
- A. Infecciones de piel  
B. Neumonía  
C. Encefalitis  
D. Pancreatitis  
E. Glomerulonefritis
75. ¿En qué etapa del desarrollo gestacional se produce la implantación endometrial?
- A. Blastocisto  
B. Oocito maduro  
C. Mórula  
D. Blastómero  
E. Cigoto
76. ¿Cuál es la localización más frecuente de los linfomas en el aparato digestivo?
- A. Estómago  
B. Apéndice cecal  
C. Duodeno  
D. Colon derecho  
E. Colon izquierdo
77. ¿Qué complicación a corto plazo se presenta en la obesidad infantil?
- A. Problemas psicosociales  
B. Gota metabólica  
C. Obesidad adulta  
D. Enfermedad cardiovascular  
E. Cáncer
78. En un centro de salud se utiliza un mapa epidemiológico consignando el tipo de aprovisionamiento de agua en los hogares. Mensualmente se ubica en el mapa los casos de EDA, observándose la relación de los hogares con suministro de agua inadecuado, lo cual facilita la planificación local para el control del EDA. Esta información está disponible en...
- A. la sala situacional.  
B. las estadísticas de gestión sanitaria.  
C. el avance de metas sanitarias.  
D. el monitoreo situacional  
E. el monitoreo epidemiológico integral
79. Lactante de 2 meses, inicia a las cuatro semanas de vida cuadro catarral, afebril y dificultad respiratoria progresiva. Antecedente: conjuntivitis aguda bilateral a los 10 días de vida. Examen: Sat O<sub>2</sub>: 91%, FR: 65 X', leve tiraje subcostal, estertores inspiratorios y crepitantes. Leucocitos: 19.600/mm<sup>3</sup>, IgG: 13.262/mm<sup>3</sup>. TAC tórax: patrón en mosaico con áreas en vidrio deslustrado y zonas de hiperinflación. ¿Cuál es el probable germen etiológico?
- A. *Chlamydia trachomatis*  
B. *Legionella pneumophila*  
C. *Bordetella pertussis*  
D. *Mycoplasma pneumoniae*  
E. *Chlamydia pneumoniae*

80. Se denomina lesiones de ligamentos de grado II cuando se produce ...  
A. roturas parciales y puede provocar inestabilidad.  
B. estiramientos sin inestabilidad.  
C. roturas completas y provocan inestabilidad.  
D. roturas completas y síndrome compartimental.  
E. estiramientos y síndrome compartimental.
81. Varón de 75 años que refiere estar en tratamiento por hiperplasia benigna de próstata; sin embargo nota hematuria e infecciones urinarias repetidas. ¿Qué solicita inicialmente para descartar cáncer de próstata?  
A. Dosaje de antígeno específico de la próstata  
B. Citología de la orina  
C. Cistoscopia  
D. Ecografía prostática  
E. Tomografía
82. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente de la diarrea disintérica en lactantes?  
A. *Campylobacter jejuni*  
B. *Salmonella sp*  
C. *Legionella*  
D. *Yersinia enterocolitica*  
E. *Escherichia coli*
83. De acuerdo a la clasificación de Todani para quistes de colédoco. ¿Cuál es el tipo más frecuente?  
A. I  
B. II  
C. III  
D. IV  
E. V
84. Mujer de 60 años, consulta por debilidad muscular, poliuria, polidipsia, dolores articulares y estreñimiento. Antecedente: úlcera péptica. Examen: PA: 150/95 mmHg. EKG: QT corto y onda T ensanchada. Laboratorio: calcio sérico y paratormona elevadas. ¿Cuál es el diagnóstico?  
A. Hiperparatiroidismo primario  
B. Diabetes mellitus tipo II  
C. Hiperparatiroidismo secundario  
D. Osteodistrofia renal  
E. Síndrome pluriglandular
85. ¿A qué nivel de prevención corresponde la búsqueda de sintomático respiratorio?  
A. Secundaria  
B. Primordial  
C. Primaria  
D. Terciaria  
E. Cuaternaria
86. En un niño con intoxicación por kerosene. ¿Cuál es la complicación más frecuente?  
A. Neumonitis  
B. Neumonía  
C. Metahemoglobinemia  
D. Neumatocele  
E. Arritmia
87. Recién nacido varón con Síndrome de Patau. ¿Cuál es la anomalía cromosómica que se relaciona con esta patología?  
A. Trisomía 13  
B. Trisomía 21  
C. Trisomía 18  
D. Trisomía de X  
E. Monosomía de X
88. De los siguientes hallazgos. ¿Qué criterios mayores son considerados para el diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica?  
A. Dolor pélvico y dolor a la palpación anexial  
B. Fiebre ( $T > 38^{\circ}\text{C}$ ) y dolor pélvico  
C. Sensibilidad hipogástrica y hemograma con leucocitosis  
D. PCR aumentada y dolor anexial a la movilización del cérvix  
E. Líquido libre en fondo de saco por ecografía y dolor pélvico
89. En la cadena epidemiológica. ¿Cuál de las siguientes puertas de salida, es en general la más importante y difícil de controlar?  
A. Tracto respiratorio  
B. Tracto digestivo  
C. Tracto genitourinario  
D. La piel  
E. La placenta

90. El alcalde de Chaclacayo se reúne con todos los sectores y organizaciones representativas del distrito, para elaborar el presupuesto participativo y el plan de desarrollo local. ¿Qué dimensión de la promoción de la salud aplicó?
- A. Política  
B. Social  
C. Económica  
D. Psicosocial  
E. Cultural
91. Gestante de 12 semanas por FUR, usuaria de DIU hace 6 meses. Examen preferencial: se visualiza guía de DIU por el cérvix. ¿Cuál es la conducta a seguir?
- A. Retiro de DIU  
B. Antibioticoterapia  
C. AMEU  
D. Uso de misoprostol  
E. Legrado uterino
92. En la intoxicación por carbamatos. ¿A qué efecto se deben las manifestaciones clínicas?
- A. Nicotínico-muscarínico  
B. Adrenérgico-colinérgico  
C. Vipérgico-noradrenérgico  
D. Aminérgico-vipérgico  
E. Peptidérgico-colinérgico
93. ¿En qué tipo de célula se produce principalmente la testosterona?
- A. Leydig  
B. Sertoli  
C. Paneth  
D. Germinativa  
E. Intercalada
94. Para un lactante de 8 Kg con cuadro de deshidratación severa por diarrea aguda infecciosa. ¿Qué volumen de suero fisiológico en ml debe infundir?
- A. 160  
B. 80  
C. 240  
D. 40  
E. 100
95. ¿Cuál de los hallazgos en radiografía de tórax, se considera un criterio para diagnosticar síndrome de distres respiratorio del adulto?
- A. Infiltrados alveolares intersticiales bilaterales  
B. Lesiones en panal de abeja en bases  
C. Imágenes vasculares en ala de mariposa  
D. Patrón en forma de vidrio esmerilado  
E. Lesiones de tipo reticulonodulillar difusos
96. La mayor parte de hierro en el organismo se encuentra como...
- A. hemoglobina.  
B. mioglobina.  
C. ferritina.  
D. hemosiderina.  
E. apoferritina.
97. En el ojo que ha sufrido una lesión penetrante y después de tomar las medidas locales oftalmológicas. Es aconsejable prevenir un probable traumatismo posterior. ¿Qué fármaco se administra?
- A. Antiemético  
B. Antihipertensivo  
C. Diurético de asa  
D. Antiinflamatorio  
E. Diurético osmótico
98. Paciente en estado de coma. ¿En qué situación clínica está indicada la intubación traqueal?
- A. Apnea persistente  
B. Hipotensión arterial persistente  
C. Hipoxia hipercápnica  
D. Mioclonias localizadas  
E. Midriasis parálitica bilateral

99. Paciente de 26 años, con amenorrea primaria, desarrollo mamario normal, con escaso vello púbico y axilar. Tiene informe de cariotipo XY. ¿Cuál es el diagnóstico?
- A. Insensibilidad a los andrógenos
  - B. Septum vaginal transverso completo
  - C. Aplasia cervical
  - D. Síndrome de Turner
  - E. Síndrome de Mayer Rokitansky
100. ¿Cuál de los siguientes músculos de la pared torácica contribuye a determinar el volumen de reserva espiratoria?
- A. Intercostal interno
  - B. Intercostal externo
  - C. Subcostal
  - D. Serrato anterior
  - E. Escaleno